

## Nach der Operation

Direkt nach der Operation erhalten Sie eine leichte Blutverdünnung (Thromboseprophylaxe), welche jedoch noch nicht Ihrer üblichen Blutverdünnung entspricht. Dies kann über eine Spritze oder über ein kontinuierlich appliziertes Medikament geschehen.

Je nach Dringlichkeit einer Wiederherstellung Ihrer Blutverdünnung und dem Risiko einer möglichen Nachblutung, erfolgt bereits in den ersten Tagen die Wiederaufnahme der Blutverdünnung mit einem kürzer wirksamen und kontrollierbaren Medikament.

### Vorsicht!

Sollten Sie nach der Operation

- einen grösser werdenden Bluterguss
- eine erneut aufgetretene Blutung
- einen neu aufgetretenen Schwindel
- neue Bauchschmerzen

bemerken, dann kontaktieren Sie bitte umgehend Ihren Hausarzt/ Ihre Hausärztin oder den Dienstarzt/die Dienstärztin Chirurgie (T 032 627 33 33)

Sollten Unklarheiten bezüglich der Blutverdünnung bestehen, kontaktieren Sie bitte den Dienstarzt/die Dienstärztin Chirurgie (T 032 627 33 33)

## Bei Austritt

### Sie treten mit einer Blutverdünnung in Form von Spritzen aus

Clexane \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

### Sie treten mit Marcoumar aus

\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Tbl.

\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Tbl.

\_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_ : \_\_\_\_ Tbl.

### Gleichzeitig ist die Thromboseprophylaxe-Spritze mit Clexane weiterzuführen bis der gewünschte Marcoumarspiegel wieder im therapeutischen Bereich ist

Clexane \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

Nächste Quickkontrolle am: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

### Ihr Arzt/Ihre Ärztin wird mit Ihnen die weitere Marcoumar-Dosierung vornehmen

Nächste Quickkontrolle am: \_\_\_\_ . \_\_\_\_ . \_\_\_\_

### Sie treten mit Ihrer üblichen Blutverdünnung aus

Xarelto \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

Eliquis \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

### Sie treten mit Ihren üblichen Blutplättchenhemmern aus

Aspirin \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

Plavix \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

\_\_\_\_\_ \_\_\_\_ mg  morgens  mittags  abends  nachts

PATIENTENINFORMATION

# BLUTVERDÜNNUNG VOR UND NACH DER OPERATION



Bürgerspital  
Solothurn **solothurner  
spitäler** **so** **H**

Schöngrünstrasse 42 | 4500 Solothurn  
T 032 627 31 21  
info.bss@spital.so.ch



10019 | 06.19 | ????

Bürgerspital  
Solothurn

**solothurner  
spitäler** **so** **H**

# Herzlich willkommen

Liebe Patientin, lieber Patient

Bei Ihnen steht eine Operation an. Diese Broschüre soll Ihnen bis nach der Operation aufzeigen, wie lange Sie mit welchem Medikament die Blutverdünnung durchführen sollen.

Um das Risiko einer Blutung zu verkleinern, ist es notwendig, die Blutverdünnung für die Operation vorübergehend zu stoppen oder mit einem kurz wirksamen Blutverdünner zu überbrücken.

Bitte nehmen sie diese Informationsbroschüre zum Gespräch mit dem Narkosearzt/der Narkoseärztin mit.


Dieses Gespräch findet am

\_\_\_\_. \_\_\_\_ . \_\_\_\_ um \_\_\_\_ Uhr auf Stock C im Haus 6 statt.

# Stopp Ihrer Blutverdünnung vor der Operation

Sie nehmen Ihre Blutverdünnung **unverändert** bis zur Operation ein.

Sie **verändern** Ihre Blutverdünnung bis zum Operationstermin wie folgt:



# Überbrückung Ihrer Blutverdünnung vor der Operation

Sie **überbrücken** Ihre Blutverdünnung bis zum Operationstermin wie folgt:

